

Evaluering av epikriser

Legen som skriver epikrisen skal følge **bokføringsprinsippet** med absolutt krav til balanse. Antall medisiner på medikamentlisten som registreres i journalen ved innleggelse, skal stemme med antall medisiner oppført i epikrisen; oppsummert i formelen:

MEDISINER UT = MEDISINER INN +/- ENDRINGER.

I tiltakspakken for samstemming av legemiddellister evalueres et utvalg av epikriser etter følgende kriterier, og med tilhørende poengscore:

Spørsmål:	Ja	Delvis	Nei
Er kilde oppgitt	2 poeng		0 poeng
Går regnskapet opp?	2 poeng		0 poeng
Er endringer begrunnet?	2 poeng	1 poeng	0 poeng
Er salgsnavn angitt?	2 poeng		0 poeng
Er generisk navn angitt?	2 poeng	1 poeng	0 poeng
Er dosering angitt?	2 poeng	1 poeng	0 poeng
Er indikasjon angitt?	2 poeng	1 poeng	0 poeng
Er kategori angitt?	2 poeng	1 poeng	0 poeng

Maksimal poengscore er 16 poeng.

KOMMENTARER: Det er en viktig forsikring for fastlegen som skal foreta en legemiddelsamstemming at kilden til opplysningene fremgår. Det er en forutsetning for tillitten til listen i epikrisen at regnskapet går opp. Derfor gis 2 poeng for disse parametrene.

Alle endringer skal begrunnes i fritekst rett før selve medisinlisten. Eksempler: *Diltiazem seponert pga. interaksjonsfare med simvastatin. Oppstart av warfarin pga. atreiflimmer og CHA2DS2VASc-skår: 3. Furosemid er seponert pga. usikker indikasjon.*

Alle epikriser som inneholder en medisinliste vil få 2 poeng for punktet: "Er salgsnavn angitt". Poeng for generisk navn gis bare når dette er tilføyd merkevarenavnene!

Etter hvert angitt legemiddel skal en av fem kategorier markeres med store bokstaver:

SOM FØR - NY - ENDRET DOSE – KUR - SLUTT

EKSEMPEL PÅ LEGEMIDDELAVSNIITT I EPIRKISE - MED POENGSKÅRING:

Legemidler ved utreise:

Legemidler ved innleggelsen bygger på medisinliste fra fastlegen.

Begrunnelse for endringer under oppholdet:

Warfarin er innført pga. kronisk atrieflimmer med CHA2DS2VAS2c: 3

Furosemid er seponert pga. usikker indikasjon.

Simvastatin økt fra 20mg til 40mg pga. LDL>2,0 og kjent koronarsykdom.

Medisiner ved utreise:

Cozaar (Losartan) 50mg x 1. Blodtrykksmedisin. SOM FØR

Selo-Zok (Metoprolol depot) 100mg x 1. Hjertemedisin. SOM FØR

Marevan (Warfarin) 2,5mg. Følg eget dosekort. Forebygger blodpropp. NY

Simvastatin 40mg om kvelden. Kolesterolenkende. ENDRET

Furix (Furosemid) 20mg x 1. Vanndrivende. SLUTT

Imovane (zopiclone) 5mg om kvelden ved behov. Sovemedisin. SOM FØR

NB: Legemidler som er seponert eller inngår i en tidsbegrenset kur, skal være skilt med tydelig mellomrom fra selve medisinlisten som pasienten skal fortsette med å følge.

KONKLUSJON:

Denne epikrisen ville oppnådd fullt hus: 16 poeng!